โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	ฉบับที่ 2
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลขที่ CPG-PONG-PED-04	วันที่เริ่มใช้ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การดูแลผู้ป่วยเด็กชักจากไข้สูง	ผู้ทบทวน นพ.ดำรงศักดิ์ ล้วนทอง
ผู้จัดทำ ทีม PCT	ผู้อนุมัติ ทพญ.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล

Febrile Convulsion

<u>นิยาม</u>
- อายุ 6 เดือน – 5 ปี , มีไข้ ≥ 38°c
- ไม่ได้เกิดจาก central nervous system infection or metabolic imbalance
- ไม่มีประวัติชักขณะไม่มีไข้มาก่อน

ให้การรักษาเบื้องต้น

- นอนตะแคงศีรษะต่ำ วางผู้ป่วยบนพื้นราบหรือเตียงกว้าง คลายเสื้อผ้าที่รัด ดูทางเดินหายใจ ดู FB ในปาก
- ไม่ใช้ช้อน หรือวัสดุใด ๆ งัดปาก
- เช็ดตัวลดไข้
- ถ้าชักนาน > 5 นาที diazepam 0.3 มก./กก. IV หรือ 0.5 มก./กก. Rectal suppo ไม่เกิน 10 มก.
- ให้การสื่อสารกับญาติ

ซักประวัติ ตรวจร่างกาย

Simple febrile convulsion
- Generalized tonic-clonic
- สัมพันธ์กับไข้ มีไข้ < 24 ชม.
- ชัก < 15 mins
- ไม่ชักซ้ำใน 24 ชม.
- หลังชักไม่มี neuro deficit

complex febrile convulsion
- focal seizure
- ชักหลังมีไข้ > 24 ชม.
- ชัก > 15 mins
- ชักซ้ำใน 24 ชม.
- หลักชักมี neuro deficit

REFER

ADMIT

CBC Electrolyte Ca Mg Alb Blood Sugar ทุกราย

Normal

Abnormal รักษา ตาม สาเหตุ

อายุน้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 เดือน
พิจารณา LP ทุกราย

อายุมากกว่า 12 เดือน
LP if – Meningeal sign positive
- alteration of consciousness
- AF bulging, tense

LP ส่ง cell count, cell differentiation, gram stain, culture

Normal
รักษาเรื่องไข้
Advice reassure

ABNormal
Dx meningitis start ATB