

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	หน้า 1/2
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ : WP-PONG-PCT-80	ฉบับที่ 3
เรื่อง แนวทางการดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด	วันที่เริ่มใช้
ผู้จัดทำ ทีม PCT	ผู้อนุมัติ ทพญ.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล

## 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้มารดาหลังคลอดปลอดภัยจากภาวะ Shock หลังตกเลือด

## 2. ขอบเขต

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ Shock หลังตกเลือด

## 3. คำนิยามศัพท์

มารดาหลังคลอดที่มีภาวะ Shock หลังตกเลือด

## 4. เอกสารอ้างอิง

คู่มือเวชปฏิบัติการคลอดมาตรฐาน 2558

## 5. นโยบาย

ใช้เป็นแนวทางให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ห้องคลอดให้การดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด

## 6. ความรับผิดชอบ

ทีม PCT

## 7. ขั้นตอนการปฏิบัติ

เมื่อประเมินพบ PR > 110/min, BP < 85/45 mmHg., Spo2 < 95% หรือ V/S change > 15% ของ baseline

1. ให้ LRS / 0.9% NSS 1,000 ml IV load 500 – 1,000 ml ใน 30 นาที
2. ให้ LRS / 0.9% NSS 1,000 ml ผสม Oxytocin 10-20 unit IV 150 ml/hr. จนครบ 24 ชม.
3. On O2 mask with bag 15 LPM
4. Keep warm
5. Retain foley's catheter ตรงปัสสาวะทุก 1 ชม. (urine > 0.5 ml/kg/hr)
6. Cheek V/S ทุก 15 นาที จนครบ 2 ชม., ทุก 30 นาที 2 ครั้ง, ทุก 1 ชม. 2 ครั้ง, ทุก 2 ชม. 2 ครั้ง จากนั้นทุก 4 ชม. จนครบ 24 ชม.
7. คลั่งมดลูกทุก 15 นาที จนครบ 2 ชม. จากนั้นทุก 4 ชม. จนครบ 24 ชม.

## เรื่อง แนวทางการดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด

8. ประเมิน Bleeding per vagina ทุก 1 ชม. จนครบ 2 ชม. จากนั้นทุก 4 ชม. จนครบ 24 ชม.
9. ประเมิน Hct ทุก 2 ชม.
  - Hct 25 – 30% ให้ PRC 2 unit
  - Hct < 25% หรือลดลง > 10% (Refer กรณีไม่มีเลือด)
10. Refer รพศ. กรณีแก้ไขไม่สำเร็จ

**8. ตัวชี้วัด**

อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ shock

**9. ภาคผนวก**

-

**10. Flow chart**

-

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน  
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WP-PONG-PCT-80  
เรื่อง  
แนวทางการดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด

	ตำแหน่ง	ลงนาม	วัน เดือน ปี
ผู้จัดทำ ทีม PCT งานห้องคลอด			
ผู้ทบทวน ทีม PCT งานห้องคลอด			1 เมษายน 2561
ผู้อนุมัติ ทพญ.ชัชรินทร์ ยงกัลยาณกุล	<input type="checkbox"/> หัวหน้าฝ่าย <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อำนวยการ		
สำเนาฉบับที่ 3 เอกสารฉบับ <input checked="" type="checkbox"/> ควบคุม <input type="checkbox"/> ไม่ควบคุม หน่วยงานที่ใช้ร่วมกัน			

ทบทวนครั้งที่	วันที่	ประเด็นปรับปรุง
1.	24 พ.ย.57	ปรับปรุงบันทึกทางการพยาบาลและ Order standing การดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด
2.	28 พ.ค.58	ปรับปรุง CPG การดูแลภาวะ Shock หลังตกเลือด
3.	20 มิ.ย.58	ปรับปรุงแนวทางการประเมินปริมาณเลือด และเพิ่มแนวทางการตรวจวัดสัญญาณชีพ
4.	1 พ.ย.58	ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลและเกณฑ์การประเมินภาวะ shock
5.	1 มี.ค.60	ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลและ Order standing
6.	1 เม.ย. 61	ปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลและ Order standing