

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	หน้า 1/1
ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WP-PONG-PCT-05	ฉบับที่ 4
เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด	วันที่เริ่มใช้ 1 มีนาคม 2566
ผู้จัดทำ ทีม PCT	ผู้อนุมัติ นพ.นันทวัช เมตตากุลพิทักษ์

## 1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนได้รับการผ่าตัด
2. เพื่อพิจารณาการใช้ยาระงับความรู้สึกที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

## 2. ขอบเขต

การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

## 3. คำนิยามศัพท์

การเตรียมความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัด หมายถึง การประเมินสภาพผู้ป่วย การประเมิน vital signs การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการเตรียมด้านร่างกายและจิตใจ

## 4. เอกสารอ้างอิง

วรภา สุวรรณจินดาและอังคาบ ปราการรัตน์ (บรรณาธิการ) ตำราวิสัญญีวิทยา กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กรุงเทพเวชสาร

## 5. นโยบาย

1. เมื่อแพทย์ดูแลผู้ป่วยและต้องการ Set ผ่าตัด ต้องปฏิบัติ ต้องปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยเคร่งครัด
2. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย วิสัญญีพยาบาล พยาบาลห้องผ่าตัดปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดโดยเคร่งครัด

## 5. ความรับผิดชอบ

1. แพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ป่วย
2. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย IPD, ER, OPD, LR, OR
3. พยาบาลวิสัญญี

ระเบียบปฏิบัติเลขที่ WP-PONG-PCT-05	หน้าที่ 2/2
เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด	

## 7. ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยและต้องการ Set ผ่าตัด พิจารณาตรวจร่างกายผู้ป่วยก่อน Set ผ่าตัดดังนี้

อายุ	การตรวจทางห้องปฏิบัติการ	การตรวจร่างกาย
1). อายุต่ำกว่า 40 ปี	Hb or Hct	ตรวจ Heart , Lung และระบบที่เกี่ยวข้อง
2). อายุ 40-59 ปี	Hb or Hct EKG , Creatinine , GLUCOSE	ตรวจ Heart , Lung และระบบที่เกี่ยวข้อง
3). อายุ 60 ปีขึ้นไป	Hb or Hct EKG , CXR Creatinine , GLUCOSE	ตรวจ Heart , Lung และระบบที่เกี่ยวข้อง

2. พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยติดตามผลการตรวจให้แพทย์ดู

3. แพทย์พิจารณา Set ผ่าตัด

4. พยาบาลวิสัญญีเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ตรวจสอบรายการและผลการตรวจอีกครั้ง ถ้าพบปัญหาความขัดข้องประการใด ประสานกับแพทย์

5. พยาบาลห้องผ่าตัด เยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด การปฏิบัติตน

6. กรณีผ่าตัดฉุกเฉิน ให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ว่าจะตรวจร่างกายผู้ป่วยในรายการใดบ้าง

## 8. ตัวชี้วัด

1. อัตราการเลื่อนผ่าตัด เนื่องจากความไม่พร้อมจากการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด

2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดเนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัด

## 9. ภาคผนวก

ระยะเวลาที่ควรให้ผู้ป่วยงดอาหารก่อนให้ยาระงับความรู้สึก

1. อายุ 0 - 6 เดือน NPO 3 ชั่วโมง

2. อายุ 6 - 36 เดือน NPO 4 ชั่วโมง

3. อายุมากกว่า 36 เดือน NPO 6 ชั่วโมง

\* ถ้าเป็นกรณีต้องรีบช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่จำเป็นต้องรอเซ็นยินยอม ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

## 10. Flow chart

-

